



Si el **test de VIH** te dio **negativo** (no reactivo), significa que **no tenés** el virus. Es importante que consideres el **periodo ventana**.

¿Qué es el **periodo ventana**?

Es el tiempo que transcurre desde que el virus entra al cuerpo hasta que las pruebas pueden detectarlo.

En este período, un test puede dar negativo, aunque la persona tenga el virus.

Esto se debe a que es una infección muy reciente.

Es importante que si te quedan dudas consultes con el equipo de salud para repetir el test.

Es importante recibir información clara y precisa sobre el VIH.

Si tenés dudas, podés llamar al

0800 333 3444

desde todo el país.

Tu pregunta es confidencial.

argentina.gob.ar/salud/vih-its

#haceteeltest



Ministerio de Salud
República Argentina

Existen diversos métodos para
prevenir el VIH



En nuestro país además
del **preservativo**, está disponible la
Profilaxis Pre Exposición
(PrEP) y la
Profilaxis Post Exposición
(PEP).

PrEP

Es el uso de
medicación antirretroviral
(una pastilla por día) en
personas sin VIH, antes de
una exposición sexual para
disminuir el riesgo
de infección.

La PrEP tiene más de
99% de efectividad para
prevenir el VIH cuando se
toma todos los días.

Es segura y se tolera bien.

La PrEP **no te protege** de
otras Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS).



PEP

Es la toma de
medicación antirretroviral
en **personas sin VIH**,
luego de una exposición
(por ejemplo, si se rompió el
preservativo, se salió o no se usó)
para **disminuir el riesgo**
de infección.

Para que sea efectiva,
debe **iniciarse cuanto antes** y
como máximo **dentro** de las
72 horas posteriores
a la exposición.

**La indicación de PEP es
una urgencia.**

