HLB

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO
(datos a diciembre 2019)

CORRIENTES



CUIDEMOS NUESTROS CÍTRICOS
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL HLB

SINAVIMO
Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas

senasa

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

CAPACIDAD PRODUCTIVA

Esta provincia es la segunda mayor productora de naranjas y mandarinas del país.

Ocupa una superficie citrícola de 30.697 hectáreas, lo que representa el 21,8 % de la superficie nacional.

PRODUCCIÓN CITRÍCOLA

21,8 %

DEL TOTAL NACIONAL

+545 MIL

TONELADAS DE CÍTRICOS

FUENTE: Federcitrus, 2017.

SUPERFICIE IMPLANTADA (has/especie)



FUENTE: Federcitrus, 2017.

VIGILANCIA FITOSANITARIA

INTENSIDAD DE MONITOREOS

Cantidad de monitoreos

Ituzaingó y Alvear son los departamentos con detecciones positivas de HLB hasta diciembre de 2019.



FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019.

MONITOREOS desde 2010 a diciembre de 2019

+51MIL
SITIOS MONITOREADOS

4.116
MUESTRAS



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Material Vegetal Negativo	7	0	5	56	545	193	141	158	309	468
Material Vegetal positivo	0	0	0	0	0	0	0	61	8	11
Psilido Negativo	130	155	176	275	242	111	80	85	339	395
Psilido Positivo	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5
Sitios Monitoreados	585	784	1.788	2.841	5.994	6.898	6.954	6.626	7.949	10.978

FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019

CONTINGENCIA ACTIVA

ÁREA BAJO CONTINGENCIA FITOSANITARIA ITUZAINGÓ



ÁREA BAJO CONTINGENCIA FITOSANITARIA ALVEAR





Realizado por el Área Cartográfica



Realizado por el Área Cartográfica

FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019.

CONTINGENCIA ACTIVA

DISTRIBUCIÓN DETECCIONES



FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019.

Desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 2019 se detectaron 91 muestras positivas a la presencia de HLB tomadas durante las acciones de monitoreo. Estas detecciones se presentaron en arbolado urbano y traspatios, tanto en plantas cítricas como en *Diaphorina citri* portadores de la bacteria.