

INFOGRAFÍA PESCADILLA DE RED

Cynoscion guatucupa

DÓNDE VIVE

Se la encuentra en aguas costeras, estuarinas y de plataforma, entre la costa y profundidades de hasta 100 metros, en salinidades no inferiores a 18 y temperaturas entre 13,1° C y 20,8° C. Es un pez demersal-pelágico, es decir, vive en relación con el fondo marino, pero

durante la noche realiza desplazamientos ascendiendo a capas próximas a la superficie.

CUERPO

Cuerpo fusiforme, cubierto de escamas regulares a grandes. Cabeza contenida más de tres veces en la longitud total. Hocico bastante puntiagudo debido al leve prognatismo de la mandíbula inferior. Narinas de tamaño regular, muy próximas a los ojos.

COLOR

Coloración dorsal del cuerpo gris azulado, aclarándose en los flancos, con estrías oscuras que acompañan las series oblicuas de escamas, zona abdominal blanquecina. Aletas dorsales y caudal gris oscuro; pectorales, ventrales y anal más claras.

CICLO DE VIDA

Es una especie relativamente longeva, se han observado hasta 23 años de edad en hembras (40-52 cm de longitud total) y hasta 22 años (40-51 cm) en machos.

ALIMENTACIÓN

Los juveniles se alimentan de crustáceos (camarón blanco, camarón, cría de langostino) y en menor medida de peces como la anchoíta. A medida que la pescadilla crece, estos organismos son reemplazados en la dieta por peces, hasta hacerse dominantes. Entre ellos aparecen la anchoíta, surel, anchoa, etc. Se presenta canibalismo.



MÉTODO DE CAPTURA

Es capturada tanto por la flota costera, la de Rada o Ría y las embarcaciones medianas y grandes que operan con red de arrastre. En áreas muy costeras se la pesca con la modalidad a la pareja. En distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, los pescadores artesanales utilizan redes de enmalle, palangres y líneas de mano para su captura. También es objeto de pesca deportiva.

IMPORTANCIA PESQUERA

Para el mercado externo se la comercializa congelada, entera, como filete y, en menor medida, como tronco (sin cabeza y sin vísceras) y fresca en el mercado interno.



filete



entero



filete

TEMPORADA DE PESCA

Ene > Feb > Mar > Abr > May > Jun > Jul > Ago > Sep > Oct > Nov > Dic

Si bien se la captura todo el año, los mayores desembarques se registran en los meses de junio a septiembre.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Habita desde Río de Janeiro (Brasil) hasta el norte del Golfo San Jorge (Argentina).

