

INFOGRAFÍA PEZ PALO

Percophis brasiliensis

DÓNDE VIVE

Pez de hábitos costeros y bentónicos (1), se localiza a profundidades de 75 mts.

(1). Sectores próximos al fondo marino.

CUERPO

Muy alargado, de forma cilíndrica y aguzada en los extremos. La altura del cuerpo está incluida más de nueve veces en la longitud total. Escamas medianas a pequeñas. Boca grande, provista de fuertes dientes.

COLOR

La parte dorsal es de coloración marrón, con motas más claras hacia los flancos. El vientre es blanquecino.

CICLO DE VIDA

La actividad reproductiva acontece durante la primavera y el verano, con un pico de puesta en noviembre y otro de menor intensidad en marzo. La longitud de la primera madurez, considerando a ambos sexos en conjunto, se situaría alrededor de los 31 cm.

ALIMENTACIÓN

La conformación de su boca refleja sus hábitos predatorios. Efectúa migraciones verticales para obtener su alimento, aunque la forma más frecuente de capturar a sus presas es al acecho. Entre sus presas se encuentran: peces, moluscos, poliquetos y crustáceos. Consume preferentemente surel y anchoíta.



MÉTODO DE CAPTURA

Es capturado por flotas de rada o ría, costeras y de altura, con redes de arrastre de fondo.

CURIOSIDADES

Las hembras desovan en promedio 40.000 ovocitos por primera vez a los 3 años. A medida que transcurren los años, podrían llegar a liberar más de 500.000 ovocitos al ambiente.

IMPORTANCIA PESQUERA

Se comercializa como filete sin piel y sin espinas, congelado para el mercado externo y fresco para el interno.



filete



entero



entero

TEMPORADA DE PESCA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

La mayor actividad se registra en los meses cálidos. Presenta una marcada estacionalidad en las capturas dentro del área del Ecosistema Costero Bonaerense.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Desde la latitud de Río de Janeiro, en Brasil (22° S) hasta los 47° S en la Argentina. Las mayores concentraciones frente a las costas argentinas se producen en primavera, entre los 39° S y 41° S.

